

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 6 del 05.06.2023

Fase fenologica prevalente: **Bottoni fiorali separati**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

In queste condizioni di instabilità climatica e di previsione di ulteriori piogge, si consiglia di sfruttare le finestre di bel tempo tra una pioggia e quella successiva per intervenire con un fungicida antiperonosporico a base di **Rame**. Ripetere il trattamento, anche a breve distanza (3-4 giorni) in occasione di una nuova finestra di cielo sereno.

Si ricorda che anche per questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

Si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo bagnabile**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617