

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 11 del 18.07.2023

Fase fenologica prevalente: **Chiusura grappolo**

PERONOSPORA

Trattare

La grande quantità di inoculo presente fa sì che ad ogni pioggia o rugiada possa partire una nuova infezione peronosporica.

Si consiglia di intervenire al più presto con una miscela a base di

Cymoxanil opp. **Zoxamide** + **Rame**

OIDIO

Trattare

Ci si attende una forte comparsa della malattia a partire già da questa settimana. Si consiglia di miscelare all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Cyflufenamid** opp. **Fluxapyroxad** opp.

Proquinazid. In alternativa è possibile, prestando attenzione a non distribuirlo nelle ore più calde della giornata, intervenire con un trattamento "secco" a base di **Zolfo in Polvere**.

MUFFA GRIGIA

Trattare

LOTTA INDIRETTA: Si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale sfogliatura.

LOTTA DIRETTA: per le varietà sensibili che abbiano già raggiunto la fase fenologica di pre-chiusura del grappolo, si consiglia di effettuare un trattamento specifico a base di **Fludioxonil** + **Ciprodinil**, opp. **Pirimetanil**, opp. **Fenexamide**, opp. **Fenpyrazamine**.

Affinché il prodotto possa svolgere appieno la propria azione occorre effettuare una preventiva razionale sfogliatura della fascia dei grappoli e distribuire l'intera dose per ettaro indicata in etichetta sulla fascia grappoli.

POPILLIA JAPONICA

MONITORARE

Gli attacchi del coleottero su vite si stanno lentamente riducendo. In caso di residua, abbondante presenza, si consiglia di contattare il servizio tecnico.