

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 6 del 10.06.2024

Fase fenologica prevalente: **Allegagione completata**

PERONOSPORA

Trattare

Nonostante la stagione sia finora stata caratterizzata da piogge frequenti e abbondanti, le strategie consigliate, se correttamente applicate, sono state in grado di contenere le infezioni peronosporiche che in nessuna circostanza hanno procurato perdite di produzione.

La malattia è comunque presente e ancora pericolosa e occorre quindi proseguire sistematicamente nella prevenzione. Per cui, completata la fase della fioritura della vite, si consiglia di intervenire con prodotti a base di:

Metalaxil-M + Rame

con l'eventuale aggiunta di **Fosetil Alluminio**

Entro e non oltre Giovedì 13 Giugno

OIDIO

Trattare

A causa della particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, si raccomanda di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico sistemico (I.B.E.).

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617