

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 8 del 22.07.2022

Fase fenologica prevalente: Chiusura grappolo - Inizio invaiatura



FLAVESCENZA DORATA

Trattare

In ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria relativo al controllo del vettore della Flavescenza dorata, l'attuale fase di sviluppo dell'insetto viene ritenuta idonea all'effettuazione del secondo intervento obbligatorio utilizzando un prodotto a base del principio attivo **ACETAMIPRID**.

Si consiglia di intervenire in un periodo che va **dal 24 al 31 luglio**. Trattandosi di un principio attivo efficace e registrato su vite anche contro *Popillia japonica*, l'intervento potrebbe costituire una corretta strategia per il controllo degli insetti in questa fase.

Si ricorda che l'unico formulato commerciale autorizzato su vite sia contro *Scafoideus titanus* che contro *Popillia japonica* è l'**EPIK SL** alla dose di 1,5 lt./Ha (Tempo di Carenza 14 giorni).

Nel caso in cui si fosse prossimi alla vendemmia si può propendere per l'utilizzo del **Kestrel** alla dose di 0,4 lt/Ha (T.C. 7 giorni)

Rispettare le prescrizioni del PAN (per approfondimenti vedere D.LGS 150 del 14/08/2012)

PERONOSPORA E OIDIO

MONITORARE

PERONOSPORA

L'assenza di precipitazioni e rugiade mattutine, la bassa umidità e le temperature molto elevate, non favoriscono lo sviluppo del fungo. Si consiglia quindi di **NON INTERVENIRE**.

OIDIO

La situazione è al momento sotto controllo in tutti gli areali viticoli. Nei rari casi in cui la presenza del fungo fosse già frequente e abbondante si suggerisce di contattare il proprio tecnico di riferimento

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI