

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 10 del 03.07.2023

Fase fenologica prevalente: **Pre-chiusura grappolo**

## PERONOSPORA

**Trattare**

Le ultime piogge, che fortunatamente sono seguite ad una parentesi di clima caldo che ha contribuito temporaneamente a bloccare le infezioni peronosporiche, hanno riportato ai livelli di elevato pericolo la malattia.

Si consiglia pertanto di intervenire al più presto con una miscela fungicida antiperonosporica a base di

### **Dimetomorf + Rame**

Il trattamento viene ritenuto molto importante.

## OIDIO

**Trattare**

Si consiglia di miscelare all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di

### **Cyflufenamid opp. Fluxapyroxad opp. Proquinazid**

*Se possibile, anche se ci si rende conto delle difficoltà operative, si consiglia di non miscelare il trattamento fungicida con quello insetticida contro lo Scafoideo per non ridurre l'efficacia.*

## POPILLIA JAPONICA

**MONITORARE**

Sempre più frequenti, su tutto il territorio provinciale, sono le segnalazioni di *Popillia japonica*, un fitofago di recente introduzione che desta serie preoccupazioni. Fortunatamente, al momento i reali danni su vite sono limitati, sporadici e normalmente localizzati sui filari di bordo. Il controllo dell'insetto, viene al momento svolto dal trattamento insetticida effettuato per la prevenzione delle infezioni di Flavescenza dorata.