

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 9 del 03.07.2023

Fase fenologica prevalente: **Pre-chiusura grappolo**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

Le ultime piogge, che fortunatamente sono seguite ad una parentesi di clima caldo che ha contribuito temporaneamente a bloccare le infezioni peronosporiche, hanno riportato ai livelli di elevato pericolo la malattia.

Si consiglia pertanto di intervenire al più presto con una miscela fungicida antiperonosporica a base di **Rame**.

I trattamenti potranno essere ripetuti anche a breve intervallo, per mantenere elevata la difesa antiperonosporica.

Si ricorda che anche per questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

Si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo bagnabile**. In alternativa è possibile, prestando attenzione a non distribuirlo nelle ore più calde della giornata, intervenire con un trattamento "secco" a base di **Zolfo in Polvere**.

Il trattamento con lo **Zolfo in Polvere** svolge un'azione disturbante sulla *Popillia japonica*.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617